

Rregullat e shtëpisë: Fëmijë të sëmurë

Fëmijët që janë të sëmurë nuk lejohen të vijnë në çerdhe, por duhet të qëndrojnë në shtëpi.

Ky rregull vlen edhe për ambientet tona!

Nëse fëmija juaj shfaq ndonjë nga këto simptoma, për fat të keq nuk na lejohet të kujdesemi për ta.



sy të kuq me lotim të
shtuar
ose shkarkimin e qelbit



simptomat akute të njohjes
ose shëndet të dobët të
përgjithshëm



kollë akute
kollë rraskapitëse, leh



Ethe
(>38 gradë Celsius) në
mënyrë akute ose në 24
orët e fundit



Nauze, diarre ose të vjella
akute ose kohët e fundit
48 orë



skuqje
skuqje e dukshme/
Flluska. Sidomos në
duar, këmbë ose në gojë



Ju lutemi vini re: Sëmundjet e njoftimit

Ju lutemi konsultohuni gjithmonë me një pediatër për diagnozën. Fëmijët me sëmundjet e mëposhtme nuk duhet të shkojnë në çerdhe derisa të jenë trajtuar/shëruar. Ju lutemi vini re se ekziston një detyrim për të informuar institucionin për sëmundjet e listuara më poshtë!

SËMUNDJE	RI-PRANIMI (KUR)
Salmonella, Yersinia, Campylobacter, E-Coli: Diarre e papritur, të vjella	48 orë pas zhdukjes së simptomave
Adeno-, Rota-, Noro-, Astroviren: diarre me ujë dhe të vjella të papritura	48 orë pas zhdukjes së simptomave
Sëmundja e dorës, këmbës dhe gojës skuqje të dhimbshme në gojë, këmbë në dorë me njolla të vogla të kuqe, flluska	pasi të jenë shëruar flluska (zakonisht 7 deri në 10 ditë)
Konjuktiviti: Sekrecione ose sekrecione ngjitëse, veçanërisht në mëngjes pas zgjimit. Kruarje, lot, skuqje të syve	pas shërimit
Kollë e mirë: sulmet e kollitjes spazmatike dhe gulçimi për ajër	5 ditë pas fillimit të terapisë me antibiotikë ose 21 ditë pas sëmundjes pa trajtim ose njollë negative (PCR)
Infektimi nga morrat e kokës: Kruajtje dhe skuqje e kokës, infektim i dukshëm me thërrime dhe morra	pas trajtimit të parë (certifikatë falas e mundur në Zyrën e Dresdenit për Shëndetin dhe Parandalimin)
Fruthi: njolla të kuqe të lëkurës	5 ditë pas skuqjes ose shërimit
Meningjiti meningokokal: paralizë, humbje dëgjimi, konvulsione, fontanel i fryrë ose i fortë, qafë e ngurtë e dhimbshme.	pas shërimit dhe pas terapisë me antibiotikë / pas shërimit dhe trajtimit pas antibiotikëve
Shytat: Ënjtje e gjëndrave parotide në faqe	pas rikuperimit, më e hershme 5 ditë pas ënjtjes së parotidit / Pas shërimit, minimumi 5 ditë pas ënjtjes së parotidit.
Rubeola (Parvovirus B19): njolla kaçurrela në trup	pas shfaqjes së skuqjes (nëse skuqja nuk është më infektive), kontaktet shtatzëna: konsultohuni me një mjek! (java kritike nga 8 deri në 39 të shtatzënisë)
Rubeola: Skuqje e lëkurës në të gjithë trupin	pas shërimit, më së shumti 8 ditë pas skuqjes
Ehet e kuqe të ndezura ose angina (faringjiti i bajameve): inflamacion i fytit dhe bajameve dhe skuqje	24 orë pas fillimit të terapisë me antibiotikë dhe klinikisht i shëndetshëm, përndryshe pasi simptomat të jenë ulur
Zgjebja: kruajtje e rëndë, ndonjëherë e shoqëruar me një ndjesi djegieje, veçanërisht në shtrat/gjatë gjumit, nyje të vogla - të ashtuquajturat papula - në lëkurë.	nëga 24 orë pas trajtimit
Lija e dhenve: njolla të kuqe dhe flluska në të gjithë trupin	pasi pustulat e fundit janë tharë