

# Rregullat e shtëpisë: Fëmijë të sëmurë

Fëmijët që janë të sëmurë nuk lejohen të vijnë në çerdhe, por duhet të qëndrojnë në shtëpi.

Ky rregull vlen edhe për ambientet tona!

Nëse fëmija juaj shfaq ndonjë nga këto simptoma, për fat të keq nuk na lejohet të kujdesemi për ta.



sy të kuq me lotim të  
shtuar  
ose shkarkimin e qelbit



simptomat akute të njohjes  
ose shëndet të dobët të  
përgjithshëm



kollë akute  
kollë rraskapitëse, leh



Ethe  
(>38 gradë Celsius) në  
mënyrë akute ose në 24  
orët e fundit



Nauze, diarre ose të vjella  
akute ose kohët e fundit  
48 orë



skuqje  
skuqje e dukshme/  
Flluska. Sidomos në  
duar, këmbë ose në gojë



# Ju lutemi vini re: Sëmundjet e njoftimit

Ju lutemi konsultohuni gjithmonë me një pediatër për diagnozën. Fëmijët me sëmundjet e mëposhtme nuk duhet të shkojnë në çerdhe derisa të jenë trajtuar/shëruar. Ju lutemi vini re se ekziston një detyrim për të informuar institucionin për sëmundjet e listuara më poshtë!

SËMUNDJE	RI-PRANIMI (KUR)
<b>Salmonella, Yersinia, Campylobacter, E-Coli:</b> Diarre e papritur, të vjella	48 orë pas zhdukjes së simptomave
<b>Adeno-, Rota-, Noro-, Astroviren:</b> diarre me ujë dhe të vjella të papritura	48 orë pas zhdukjes së simptomave
<b>Sëmundja e dorës, këmbës dhe gojës</b> skuqje të dhimbshme në gojë, këmbë në dorë me njolla të vogla të kuqe, flluska	pasi të jenë shëruar flluska (zakonisht 7 deri në 10 ditë)
<b>Konjuktiviti:</b> Sekrecione ose sekrecione ngjitëse, veçanërisht në mëngjes pas zgjimit. Kruarje, lot, skuqje të syve	pas shërimit
<b>Kollë e mirë:</b> sulmet e kollitjes spazmatike dhe gulçimi për ajër	5 ditë pas fillimit të terapisë me antibiotikë ose 21 ditë pas sëmundjes pa trajtim ose njollë negative (PCR)
<b>Infektimi nga morrat e kokës: Kruajtje dhe skuqje e kokës, infektim i dukshëm me thërrime dhe morra</b>	pas trajtimit të parë (certifikatë falas e mundur në Zyrën e Dresdenit për Shëndetin dhe Parandalimin)
<b>Fruthi: njolla të kuqe të lëkurës</b>	5 ditë pas skuqjes ose shërimit
<b>Meningjiti meningokokal: paralizë, humbje dëgjimi, konvulsione, fontanel i fryrë ose i fortë, qafë e ngurtë e dhimbshme.</b>	pas shërimit dhe pas terapisë me antibiotikë / pas shërimit dhe trajtimit pas antibiotikëve
<b>Shytat: Ënjtje e gjëndrave parotide në faqe</b>	pas rikuperimit, më e hershme 5 ditë pas ënjtjes së parotidit / Pas shërimit, minimumi 5 ditë pas ënjtjes së parotidit.
<b>Rubeola (Parvovirus B19): njolla kaçurrela në trup</b>	pas shfaqjes së skuqjes (nëse skuqja nuk është më infektive), kontaktet shtatzëna: konsultohuni me një mjek! (java kritike nga 8 deri në 39 të shtatzënisë)
<b>Rubeola: Skuqje e lëkurës në të gjithë trupin</b>	pas shërimit, më së shumti 8 ditë pas skuqjes
<b>Ehet e kuqe të ndezura ose angina (faringjiti i bajameve): inflamacion i fytit dhe bajameve dhe skuqje</b>	24 orë pas fillimit të terapisë me antibiotikë dhe klinikisht i shëndetshëm, përndryshe pasi simptomat të jenë ulur
<b>Zgjebja:</b> kruajtje e rëndë, ndonjëherë e shoqëruar me një ndjesi djegieje, veçanërisht në shtrat/gjatë gjumit, nyje të vogla - të ashtuquajturat papula - në lëkurë.	nëga 24 orë pas trajtimit
<b>Lija e dhenve: njolla të kuqe dhe flluska në të gjithë trupin</b>	pasi pustulat e fundit janë tharë

# Правила дома: Больные дети

Заболевшим детям не разрешается приходить в детский сад, они должны оставаться дома.

Это правило касается и наших объектов!

Если у вашего ребенка проявляются какие-либо из этих симптомов, мы, к сожалению, не имеем права о нем заботиться.



красные глаза с повышенным слезоотделением или выделение гноя



острые симптомы распознавания или плохое общее состояние здоровья



острый кашель изнурительный, лающий кашель



Высокая температура (>38 градусов Цельсия) остро или в течение последних 24 часов



Тошнота, диарея или рвота остро или недавно 48 часов



сыпь заметная сыпь/ Пузыри. Особенно на руках, ногах или во рту.



## Обратите внимание: Заболевания, подлежащие регистрации.

Для постановки диагноза всегда обращайтесь к педиатру. Детям со следующими заболеваниями не следует ходить в детский сад до тех пор, пока они не пройдут лечение/выздоровеют. Обращаем ваше внимание, что существует обязанность информировать учреждение о перечисленных ниже заболеваниях!

БОЛЕЗНЬ	ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ (КОГДА)
<b>Сальмонелла, иерсиния, кампилобактерия, кишечная палочка:</b> Внезапная диарея, рвота	Через 48 часов после исчезновения симптомов
<b>Адено-, Рота-, Норо-, Астрорирен:</b> водянистая диарея и внезапная рвота	Через 48 часов после исчезновения симптомов
<b>Болезнь рук, ног и рта</b> болезненная сыпь во рту, на руках и ногах с небольшими красными пятнами, волдырями.	после заживления волдырей (обычно от 7 до 10 дней)
<b>Конъюнктивит:</b> Липкие выделения или выделения, особенно утром после пробуждения. Зуд, слезы, покраснение глаз	после выздоровления
<b>Коклюш:</b> приступы спазматического кашля и нехватки воздуха	Через 5 дней после начала антибиотикотерапии или через 21 день после заболевания без лечения или отрицательного мазка (ПЦР)
<b>Заражение головными вшами: зуд и покраснение кожи головы, видимое заражение гнидами и вшами.</b>	после первой процедуры (бесплатный сертификат можно получить в Дрезденском управлении здравоохранения и профилактики)
<b>Корь: красные пятна на коже.</b>	5 дней после сыпи или выздоровления
<b>Менингококковый менингит: паралич, потеря слуха, судороги, выбухание или твердый родничок, болезненная ригидность шеи.</b>	после выздоровления и после антибиотикотерапии/после выздоровления и после лечения антибиотиками
<b>Свинка: отек околоушных желез на щеках.</b>	после выздоровления, не раньше, чем через 5 дней после набухания околоушной железы / После выздоровления, минимум на 5 дней после набухания околоушной железы.
<b>Краснуха (парвовирус В19): курчавые пятна на теле</b>	после появления сыпи (если сыпь уже не заразна), при контакте с беременными: обратитесь к врачу! (критический период с 8 по 39 неделю беременности)
<b>Краснуха: Покраснение кожи по всему телу.</b>	после выздоровления, не ранее чем через 8 дней после высыпания
<b>Скарлатина или ангина (тонзиллярный фарингит): воспаление горла и миндалин, сыпь.</b>	Через 24 часа после начала антибиотикотерапии и клинически здорового человека, в противном случае — после исчезновения симптомов.
<b>Чесотка: .</b> сильный зуд, иногда сопровождающийся жжением, особенно в постели/во время сна, на коже мелкие узелки – так называемые папулы.	через 24 часа после обработки
<b>Ветрянка: красные пятна и волдыри по всему телу</b>	после того, как последние пустулы высохнут