

Rregullat e shtëpisë: Fëmijë të sëmurë

Fëmijët që janë të sëmurë nuk lejohen të vijnë në çerdhe, por duhet të qëndrojnë në shtëpi.

Ky rregull vlen edhe për ambientet tona!

Nëse fëmija juaj shfaq ndonjë nga këto simptoma, për fat të keq nuk na lejohet të kujdesemi për ta.



sy të kuq me lotim të
shtuar
ose shkarkimin e qelbit



simptomat akute të njohjes
ose shëndet të dobët të
përgjithshëm



kollë akute
kollë rraskapitëse, leh



Ethe
(>38 gradë Celsius) në
mënyrë akute ose në 24
orët e fundit



Nauze, diarre ose të vjella
akute ose kohët e fundit
48 orë



skuqje
skuqje e dukshme/
Flluska. Sidomos në
duar, këmbë ose në gojë



Ju lutemi vini re: Sëmundjet e njoftimit

Ju lutemi konsultohuni gjithmonë me një pediatër për diagnozën. Fëmijët me sëmundjet e mëposhtme nuk duhet të shkojnë në çerdhe derisa të jenë trajtuar/shëruar. Ju lutemi vini re se ekziston një detyrim për të informuar institucionin për sëmundjet e listuara më poshtë!

SËMUNDJE	RI-PRANIMI (KUR)
Salmonella, Yersinia, Campylobacter, E-Coli: Diarre e papritur, të vjella	48 orë pas zhdukjes së simptomave
Adeno-, Rota-, Noro-, Astroviren: diarre me ujë dhe të vjella të papritura	48 orë pas zhdukjes së simptomave
Sëmundja e dorës, këmbës dhe gojës skuqje të dhimbshme në gojë, këmbë në dorë me njolla të vogla të kuqe, flluska	pasi të jenë shëruar flluska (zakonisht 7 deri në 10 ditë)
Konjuktiviti: Sekrecione ose sekrecione ngjitëse, veçanërisht në mëngjes pas zgjimit. Kruarje, lot, skuqje të syve	pas shërimit
Kollë e mirë: sulmet e kollitjes spazmatike dhe gulçimi për ajër	5 ditë pas fillimit të terapisë me antibiotikë ose 21 ditë pas sëmundjes pa trajtim ose njollë negative (PCR)
Infektimi nga morrat e kokës: Kruajtje dhe skuqje e kokës, infektim i dukshëm me thërrime dhe morra	pas trajtimit të parë (certifikatë falas e mundur në Zyrën e Dresdenit për Shëndetin dhe Parandalimin)
Fruthi: njolla të kuqe të lëkurës	5 ditë pas skuqjes ose shërimit
Meningjiti meningokokal: paralizë, humbje dëgjimi, konvulsione, fontanel i fryrë ose i fortë, qafë e ngurtë e dhimbshme.	pas shërimit dhe pas terapisë me antibiotikë / pas shërimit dhe trajtimit pas antibiotikëve
Shytat: Ënjtje e gjëndrave parotide në faqe	pas rikuperimit, më e hershme 5 ditë pas ënjtjes së parotidit / Pas shërimit, minimumi 5 ditë pas ënjtjes së parotidit.
Rubeola (Parvovirus B19): njolla kaçurrela në trup	pas shfaqjes së skuqjes (nëse skuqja nuk është më infektive), kontaktet shtatzëna: konsultohuni me një mjek! (java kritike nga 8 deri në 39 të shtatzënisë)
Rubeola: Skuqje e lëkurës në të gjithë trupin	pas shërimit, më së shumti 8 ditë pas skuqjes
Ehet e kuqe të ndezura ose angina (faringjiti i bajameve): inflamacion i fytit dhe bajameve dhe skuqje	24 orë pas fillimit të terapisë me antibiotikë dhe klinikisht i shëndetshëm, përndryshe pasi simptomat të jenë ulur
Zgjebja: kruajtje e rëndë, ndonjëherë e shoqëruar me një ndjesi djegieje, veçanërisht në shtrat/gjatë gjumit, nyje të vogla - të ashtuquajturat papula - në lëkurë.	nëga 24 orë pas trajtimit
Lija e dhenve: njolla të kuqe dhe flluska në të gjithë trupin	pasi pustulat e fundit janë tharë

Правила дома: Больные дети

Заболевшим детям не разрешается приходить в детский сад, они должны оставаться дома.

Это правило касается и наших объектов!

Если у вашего ребенка проявляются какие-либо из этих симптомов, мы, к сожалению, не имеем права о нем заботиться.



красные глаза с повышенным слезоотделением или выделение гноя



острые симптомы распознавания или плохое общее состояние здоровья



острый кашель изнурительный, лающий кашель



Высокая температура (>38 градусов Цельсия) остро или в течение последних 24 часов



Тошнота, диарея или рвота остро или недавно 48 часов



сыпь заметная сыпь/ Пузыри. Особенно на руках, ногах или во рту.



Обратите внимание: Заболевания, подлежащие регистрации.

Для постановки диагноза всегда обращайтесь к педиатру. Детям со следующими заболеваниями не следует ходить в детский сад до тех пор, пока они не пройдут лечение/выздоровеют. Обращаем ваше внимание, что существует обязанность информировать учреждение о перечисленных ниже заболеваниях!

БОЛЕЗНЬ	ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ (КОГДА)
Сальмонелла, иерсиния, кампилобактерия, кишечная палочка: Внезапная диарея, рвота	Через 48 часов после исчезновения симптомов
Адено-, Рота-, Норо-, Астрорирен: водянистая диарея и внезапная рвота	Через 48 часов после исчезновения симптомов
Болезнь рук, ног и рта болезненная сыпь во рту, на руках и ногах с небольшими красными пятнами, волдырями.	после заживления волдырей (обычно от 7 до 10 дней)
Конъюнктивит: Липкие выделения или выделения, особенно утром после пробуждения. Зуд, слезы, покраснение глаз	после выздоровления
Коклюш: приступы спазматического кашля и нехватки воздуха	Через 5 дней после начала антибиотикотерапии или через 21 день после заболевания без лечения или отрицательного мазка (ПЦР)
Заражение головными вшами: зуд и покраснение кожи головы, видимое заражение гнидами и вшами.	после первой процедуры (бесплатный сертификат можно получить в Дрезденском управлении здравоохранения и профилактики)
Корь: красные пятна на коже.	5 дней после сыпи или выздоровления
Менингококковый менингит: паралич, потеря слуха, судороги, выбухание или твердый родничок, болезненная ригидность шеи.	после выздоровления и после антибиотикотерапии/после выздоровления и после лечения антибиотиками
Свинка: отек околоушных желез на щеках.	после выздоровления, не раньше, чем через 5 дней после набухания околоушной железы / После выздоровления, минимум на 5 дней после набухания околоушной железы.
Краснуха (парвовирус В19): курчавые пятна на теле	после появления сыпи (если сыпь уже не заразна), при контакте с беременными: обратитесь к врачу! (критический период с 8 по 39 неделю беременности)
Краснуха: Покраснение кожи по всему телу.	после выздоровления, не ранее чем через 8 дней после высыпания
Скарлатина или ангина (тонзиллярный фарингит): воспаление горла и миндалин, сыпь.	Через 24 часа после начала антибиотикотерапии и клинически здорового человека, в противном случае — после исчезновения симптомов.
Чесотка: . сильный зуд, иногда сопровождающийся жжением, особенно в постели/во время сна, на коже мелкие узелки – так называемые папулы.	через 24 часа после обработки
Ветрянка: красные пятна и волдыри по всему телу	после того, как последние пустулы высохнут

Ev kuralları: Hasta çocuklar

Hasta çocukların kreşe gelmelerine izin verilmemektedir ancak evde kalmaları gerekmektedir.

Bu kural tesislerimiz için de geçerlidir!

Çocuğunuza bu belirtilerden herhangi birini gösteriyorsa ne yazık ki onlarla ilgilenmemize izin verilmiyor.

artan yırtılma ile kırmızı
gözler
veya irin akıntısı



akut tanıma semptomları
veya genel sağlık durumunun
kötü olması



akut öksürük
yorucu, havlayan
öksürük



Ateş
(>38 santigrat derece)
akut veya son 24 saat
içinde



Bulantı, ishal veya kusma
akut veya yakın zamanda
48 saat



döküntü
gözle görülür döküntü/
Kabarcıklar. Özellikle
ellerde, ayaklarda veya
ağzında



Lütfen dikkat: Bildirimi zorunlu hastalıklar

Teships için lütfen daima bir çocuk doktoruna danışın. Aşağıdaki hastalıklara sahip çocuklar tedavi edilene/iyileşene kadar kreşe gitmemelidir. Aşağıda listelenen hastalıklarla ilgili tesise bilgi verme zorunluluğunuza olduğunuz lütfen unutmayın!

HASTALIK	YENİDEN KABUL (NE ZAMAN)
Salmonella, Yersinia, Campylobacter, E-Coli: Ani ishal, kusma	Belirtilerin azalmasından 48 saat sonra
Adeno-, Rota-, Noro-, Astroviren: sulu ishal ve ani kusma	Belirtilerin azalmasından 48 saat sonra
El, ayak ve ağız hastalığı: Ağzada ağrılı döküntü, el ayagında küçük kırmızı noktalar, kabarcıklar	kabarcıklar iyileşikten sonra (genellikle 7 ila 10 gün)
Konjonktivit: Özellikle sabahları uyandıktan sonra yapışkan salgı veya akıntı. Kaşıntı, gözyaşı, gözlerde kızarıklık	iyileşikten sonra
Boğmaca öksürüğü: spazmodik öksürük atakları ve nefes nefese kalma	Antibiyotik tedavisine başladıkten 5 gün sonra veya hastalıktan 21 gün sonra tedavizsiz veya smear (PCR) negatifliği
Saç biti istilası: Saçlı deride kaşıntı ve kızarıklık, sirke ve bitlerle gözle görülür istila	1. tedaviden sonra (Dresden Sağlık ve Önleme Dairesi'nde ücretsiz sertifika mümkündür)
Kızamık: ciltte kırmızı lekeler	Kızarıklık veya iyileşmeden 5 gün sonra
Meningokokal menenjit: Felç, işitme kaybı, kasılmalar, şişkin veya sert fontanel, ağrılı sert boyun.	iyileşmeden sonra ve antibiyotik tedavisinden sonra / iyileşme sonrası ve antibiyotik tedavisi sonrası
Kabakulak: Yanaklardaki parotis bezlerinin şişmesi	İyileşikten sonra en erken 5 gün sonra parotis şişmesi / iyileşmeyi takiben en az 5 gün parotis şişmesinden sonra.
Kızamıkçık (Parvovirus B19): vücutta kıvırcık lekeler	Kızarıklık ortaya çıktıktan sonra (eğer döküntü artık bulaşıcı değilse), hamile kişiler: Bir doktora danışın! (hamileliğin kritik 8. ila 39. haftaları)
Kızamıkçık: Çildin tüm vücutta kızarması	İyileşmeden sonra, döküntüden en erken 8 gün sonra
Kızıl veya anjina (bademcik farenjiti): Boğaz ve bademcik iltihabı ve döküntü	Antibiyotik tedavisine başladıkten 24 saat sonra ve klinik olarak sağlıklı, aksi takdirde semptomlar azaldıktan sonra
Uyuz: . Bazen özellikle yatakta/uyku sırasında yanma hissinin eşlik ettiği şiddetli kaşıntı, ciltte papül adı verilen küçük nodüller.	Tedaviden 24 saat sonra
Su çiceği: vücutun her yerinde kırmızı lekeler ve kabarcıklar	son kabarcıklar kuruduktan sonra